



Aktualne oddziaływania i przewidywane zagrożenia dla gatunków zwierząt na podstawie wyników monitoringu w roku 2015

Uwaga: Monitoring żadnego z gatunków zwierząt nie został jeszcze zakończony, a prezentowane tu wyniki należy traktować jako częściowe.

Aktualne oddziaływania na stanowiskach gatunków zwierząt monitorowanych w roku 2015

Wpływ: „+”- pozytywny, „-”- negatywny, „0”- neutralny / Intensywność: A - duża, B - średnia, C - mała, X - nieznaną

Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-		1		
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-		1		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		
A05.01 Hodowla zwierząt	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	1			
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-		1		
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	1			
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	2	3		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		2		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1			
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>	-	1	1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-		2		



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		
A09 Nawadnianie	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-			1	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-			1	
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-		1		
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-		1		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		
B leśnictwo	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1	2	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-		4		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		3	2	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-		1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		1	1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-		1	1	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-		1		
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-		1		
	nadobnica alpejska	<i>Rosalia alpina</i>	-			13	
B02.02 wycinka lasu	nadobnica alpejska	<i>Rosalia alpina</i>	-		9		
B02.03 usuwanie podszytu	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	+	6	1		
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	1		6	
	nadobnica alpejska	<i>Rosalia alpina</i>	-	10			
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych drzew)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	+	1			



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	+		1		
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			3	1
C01.01.02 usuwanie materiału z plaż	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-		2		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		2		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-		1		
C01.07 inna działalność górnicza lub wydobywcza, nie wspomniana powyżej	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-	1			
D Transport i sieci komunikacyjne	nadobnica alpejska	<i>Rosalia alpina</i>	-		10		
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	1		1	
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	
D01.02 drogi, autostrady	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		3	1	
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-		1		
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	4	3	1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		2	1	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-	1			
	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	X				1
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1	1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-		1		
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	2			
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	1			
D01.05 mosty, wiadukty	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-		1		
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-		2		
E01.02 nieciągła miejska zabudowa	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	0	1			



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
E01.03 zabudowa rozproszona	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	2	1		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	1			
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-	1			
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1		1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	1			
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	1	1		
E03 odpady, ścieki	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	6	5		
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-	2	2		
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	7	7	4	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	3	10	2	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-	1	3	1	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-		3		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		5	2	
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>	-		2		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	5	4	2	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-		4		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1			
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-	2	2	2	
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	7	3		
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-	3	1		
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	8	1	2	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	4	4	2	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-	1	1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1	1	1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	3	2	1	



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	2	1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-	2			
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0			1	
E05 Składowanie materiałów	nadobnica alpejska	<i>Rosalia alpina</i>	-	10			
E06.02 odbudowa, remont budynków	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-		1		
F01 Akwakultura morska i słodkowodna	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-			1	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-		1	1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	2	2	3	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-	2			
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-			1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1	1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	4	3	2	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	2		1	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1			
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		1		
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	
F02.03 Wędkarstwo	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	7	3	3	2
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-	1	3	1	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-			13	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	0			1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-			1	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-			1	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	0			1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	3	6		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-			1	



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0			1	
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	1		1	1
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	5	8		
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-		5		
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	2	11	5	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	5	2		
	łosoś atlantycki	<i>Salmo salar</i>	-		1		
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-		2		
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		1		
	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	-		1		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-		5		
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-	1			
G01.03 pojazdy zmotoryzowane	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-			1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-			1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-			1	
G01.04 turystyka górską, wspinaczka, speleologia	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-		1		
G01.04.02 speleologia	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	-	1	1		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-	5	1		
G01.04.03 rekreacyjna turystyka jaskiniowa	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	-		3		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-	1	4		
G02.09 obserwowanie przyrody	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-			1	
G02.10 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	
G03 ośrodki edukacyjne	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	+			1	



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-	1			
G05.04 Wandalizm	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	1	1	6	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-	1	1	1	
	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	-		4		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-	2	6		
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-		1	1	1
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	3			
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	1	1	3	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-		4	5	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	3	6	6	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		3	4	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-			1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	2	2	7	
	łosoś atlantycki	<i>Salmo salar</i>	-		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	1	5	2	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-			1	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1	2	1	
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-	1	3	2	2
	H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		1	
koza		<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
minóg strumieniowy		<i>Lampetra planeri</i>	-			1	
minóg ukraiński		<i>Eudontomyzon mariae</i>	-		1		
różanka		<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	boleń	<i>Aspius aspius</i>	-		1		
	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych	boleń	<i>Aspius aspius</i>	-		1		
	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		2		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		3		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		3		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		3		
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	3	2	1	
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-	2	1	1	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	3	1	2	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	2	2		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	1	1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-	1	1	1	
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	2	1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1			
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	2			
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	2			
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1	2		



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	6			
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-	2			
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	4	4	1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	6	4	1	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		4		
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-	1			
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1	5	2	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	6	1	2	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	3			
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1	2		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-	1	3		
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-			1	
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	1	2	1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	2	3	4	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-	2	2		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	2	3		
	łosoś atlantycki	<i>Salmo salar</i>	-		1		
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>	-		1	1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	2	3	2	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-			1	
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			2	
J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy	boleń	<i>Aspius aspius</i>	-	1			
	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		2		



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		3		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-	1	2		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-	1	3		
J02.06 Pobór wód z wód powierzchniowych	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		
J02.06.06 pobór wód powierzchniowych przez hydroenergię	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		1		
J02.08 Podwyższenie zwierciadła wody / sztuczne zasilanie wód podziemnych	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	1			
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	1			
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-		1		
J02.12 Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	4			
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	-	1			
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	6			
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-	6	1	1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	2	1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-	3			
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	2			
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1			
J02.12.02 tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach wodnych	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	1			
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-	1			
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	-	1			
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-			1	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	-	1			
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1			
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-	1			



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	
J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-		2		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		2		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		2		
J03.02.01 zmniejszenie migracji / bariery dla migracji	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-	1			
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-	1			
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	-		3	1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		2		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		2	2	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-			1	
K01.02 Zamulenie	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	-		2		
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	2	2	2	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-			1	
K02.02 nagromadzenie materii organicznej	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-		2	1	
K02.03 eutrofizacja (naturalna)	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-	1		1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		3		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		2		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	-		1		
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>	-		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1	1	
K03.04 drapieźnictwo	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-	1		5	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-	1			
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	1



Aktualne oddziaływanie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wpływ	Intensywność			
				A	B	C	X
L Zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne	brzana	<i>Barbus barbus</i>	-		1		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	-		1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-		1		
L08 powódź (procesy naturalne)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			1	
M01.02 susze i zmniejszenie opadów	koza	<i>Cobitis taenia</i>	-	1			
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	-			3	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	-	1	1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	-		1		
U Nieznane zagrożenie lub nacisk	nadobnica alpejska	<i>Rosalia alpina</i>	X				6
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	-	1			
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	X				1
	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	X				1
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	-	1			
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	X				4
X Brak zagrożeń i nacisków	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	X				1



Przewidywane zagrożenia na stanowiskach gatunków zwierząt monitorowanych w roku 2015

Uwaga: Monitoring żadnego z gatunków zwierząt nie został jeszcze zakończony, a prezentowane tu wyniki należy traktować jako cząstkowe.

Intensywność: A - duża, B - średnia, C - mała, X - nieznana

Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
A04.01 wypas intensywny	brzana	<i>Barbus barbus</i>				1
A04.01.01 intensywny wypas bydła	koza	<i>Cobitis taenia</i>		1		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>		1		
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>		1		
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
A05.01 Hodowla zwierząt	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>		1		
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	1		1	
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/	koza	<i>Cobitis taenia</i>		2		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		1		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
B leśnictwo	brzana	<i>Barbus barbus</i>	1	1	5	
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>			1	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>		4	5	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			8	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		3	1	
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	1			
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>		2	5	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	1		2	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>			2	



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	4			
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	5			
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			1	
B02.02 wycinka lasu	koza	<i>Cobitis taenia</i>			1	
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>				2
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>			1	
	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	4	2		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	4	5		
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	2	1	6	
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru	brzana	<i>Barbus barbus</i>		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
C01.01.02 usuwanie materiału z plaż	brzana	<i>Barbus meridionalis</i>		4		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>		3		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		2		
C01.07 inna działalność górnicza lub wydobywcza, nie wspomniana powyżej	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>				2
C03.03 produkcja energii wiatrowej	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>		1		
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	1		2	
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			2	
D01.02 drogi, autostrady	brzana	<i>Barbus barbus</i>	3			
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	1			
	brzana	<i>Barbus meridionalis</i>	10			



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	5			
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	2			
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	3	3		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	2			
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	2			
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	2	1	1	
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	1		1	
D01.04 drogi kolejowe, w tym TGV	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
D04.01 lotnisko	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			1
D04.02 lądowisko, heliport	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
E Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>		1		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		1		
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>		2		
E01.01 ciągła miejska zabudowa	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
E01.02 nieciągła miejska zabudowa	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>			2	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>			2	
E01.03 zabudowa rozproszona	brzana	<i>Barbus barbus</i>	4	13	4	
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	1	3	1	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	6	20	2	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	2	20		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		2	3	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	1		3	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>		7	2	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	2	10	1	



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	2	3	3	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>		2	1	
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		4	4	
E02 Tereny przemysłowe i handlowe	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>		1		
E03 odpady, ścieki	brzana	<i>Barbus barbus</i>	2	4	1	
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>		1		
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>		5	7	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	7	9	4	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	2	6	3	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>		2	1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	2	4	2	
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	5	4		
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	2	3	1	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	2		1	1
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		6	3	
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>			1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	1			
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>		1		
E03.04 Inne odpady	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>		1		1
E06 inne rodzaje aktywności człowieka	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		2		
	łosoś atlantycki	<i>Salmo salar</i>		2		



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
E06.02 odbudowa, remont budynków	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	4	1		
F01 Akwakultura morska i słodkowodna	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	3	1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	1		1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	1	2	1	
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		1		
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
F02 Rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	1	6		
F02.03 Wędkarstwo	brzana	<i>Barbus barbus</i>		2	2	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	1	1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	1			
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	3	5	1	
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>		2		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	1			
F02.03.01 wykopywanie / zbieranie przynęty	koza	<i>Cobitis taenia</i>			2	
F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt (lądowych)	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1	2	
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	1		1	3
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	7	1		
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1	2		
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>		1		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		1		
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>		1	1	
	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>		4		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		4		
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	2			



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
G01.03 pojazdy zmotoryzowane	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	1	1		
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>		1		
G01.04.02 speleologia	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>			2	
G01.04.03 rekreacyjna turystyka jaskiniowa	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		1		
G01.05 lotnictwo, szybownictwo, paralotnictwo, baloniarstwo	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
G02.10 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
G03 ośrodki edukacyjne	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>			1	2
G05.04 Wandalizm	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	2	1	6	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	3	1	2	
	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	3	4		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	11	8		
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>		2	2	1
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	2			
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	3	1		
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
G05.09 płoty, ogrodzenia	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
H Zanieczyszczenia	brzana	<i>Barbus barbus</i>		1		
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)	brzana	<i>Barbus barbus</i>		1	3	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	4	6	1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	5	19	4	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	1	7	3	



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>			1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	5	8	5	
	łosoś atlantycki	<i>Salmo salar</i>		2		
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>	2			
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	4	13	4	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>			1	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	2	1	1	
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		5	2	1
H01.01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów przemysłowych	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1			
H01.02 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z przelewów burzowych	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>			1	
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		1		
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	boleń	<i>Aspius aspius</i>		1		
	brzana	<i>Barbus barbus</i>		2		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		3		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		3		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>		1		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	1			
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		3		
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z	boleń	<i>Aspius aspius</i>		1		



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
powodu ścieków z gospodarstw domowych	brzana	<i>Barbus barbus</i>		2		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		3		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		3		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		3		
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)	brzana	<i>Barbus barbus</i>	2			
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	4	4		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		2		
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>		1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	1			
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	5	5		
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	2	2		
H06.01 uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1		1	
H06.02 zanieczyszczenie świetlne	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	2	1		
H06.04 Zmiany elektromagnetyczne	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>				2
I01 nierodzące gatunki zaborcze	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			1	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		1	1	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>			2	
I02 problematyczne gatunki rodzime	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			1	
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		2		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		2		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		2		
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>		2		



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		2		
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)	brzana	<i>Barbus barbus</i>	1			
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	2			
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	3	1		
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1			
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	4			
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	1			1
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	brzana	<i>Barbus barbus</i>	7			
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	2			
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	6	12		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	4	11	4	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	1	4		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	6	5	4	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	4	6	4	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>	1	2		
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1	2		
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>		1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>			1	
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
	brzana	<i>Barbus barbus</i>	1	3		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	2	4		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	1	5		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	3	2		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	1	3		



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1	1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy	boleń	<i>Aspius aspius</i>	1			
	brzana	<i>Barbus barbus</i>		2		
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		3		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>	1	2		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1	3		
J02.06 Pobór wód z wód powierzchniowych	koza	<i>Cobitis taenia</i>		2		
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
J02.06.05 pobór wód powierzchniowych przez farmy rybne	brzana	<i>Barbus meridionalis</i>				1
J02.06.06 pobór wód powierzchniowych przez hydroenergię	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			1	
J02.10 gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną na potrzeby odwodnienia	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			1	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		1		
J02.12 Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie	brzana	<i>Barbus barbus</i>	7			
	brzana karpacka	<i>Barbus cyclolepis</i>	1			
	brzana	<i>Barbus meridionalis</i>	12			
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	8	3	1	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	6		2	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>	3	2	1	
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1			
J02.12.02 tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych	brzana	<i>Barbus barbus</i>	1			



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
systemach wodnych	koza	<i>Cobitis taenia</i>	1			
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>	1			
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>			1	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>	1			
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1			
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	1			
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>		1		
J03.02.01 zmniejszenie migracji / bariery dla migracji	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>	1			
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>				1
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	1			
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych)	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>			1	
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>		1	1	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		1		
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>		2	2	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>			1	
K01.01 Erozja	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>			1	
K01.02 Zamulenie	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		3	4	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>	1		2	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		2	3	
K01.03 Wyschnięcie	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	1		1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		1	1	
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1			
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	2		3	
K02.02 nagromadzenie materii organicznej	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	1		2	



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
K02.03 eutrofizacja (naturalna)	brzana	<i>Barbus barbus</i>		3	1	
	brzanka	<i>Barbus meridionalis</i>		4	3	
	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>		1		
	koza	<i>Cobitis taenia</i>		2	5	
	koza złotawa	<i>Sabanejewia aurata</i>		1	2	
	lipień	<i>Thymallus thymallus</i>		1		
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>			1	
	minóg ukraiński	<i>Eudontomyzon mariae</i>		2	2	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>		1		
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	2	1	2	
K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	łosoś atlantycki	<i>Salmo salar</i>		2		
K03.04 drapieźnictwo	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>	1	1	3	
	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>	2		6	
	minóg rzeczny	<i>Lampetra fluviatilis</i>			1	
	minóg strumieniowy	<i>Lampetra planeri</i>		1		
	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>	2	1	1	1
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		1		
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi	głowacz białopłetwy	<i>Cottus gobio</i>			1	
	koza	<i>Cobitis taenia</i>			1	
K03.06 antagonizm ze zwierzętami domowymi	nocek duży	<i>Myotis myotis</i>			2	
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>				3
L05 zapadnięcie się terenu, osuwisko	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		1	1	
L06 tąpnięcia podziemne	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>	1	3	1	
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1	2	1	
L08 powódź (procesy naturalne)	kozióróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	



Przewidywane zagrożenie	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Intensywność			
			A	B	C	X
L09 pożar (naturalny)	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>		7		
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		20		
M Zmiana klimatu	nocek orzęsiony	<i>Myotis emarginatus</i>		3	1	
	podkowiec mały	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		3	1	
M01.02 susze i zmniejszenie opadów	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>			1	
	piskorz	<i>Misgurnus fossilis</i>				1
	różanka	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>		1		
M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku	kozioróg dębosz	<i>Cerambyx cerdo</i>				3
U Nieznane zagrożenie lub nacisk	nadobnica alpejska	<i>Rosalia alpina</i>	20			6