

Selery węzłobaldachowe

Apium nodiflorum

Podstawowe informacje

GRUPA: rośliny naczyniowe

LATA MONITORINGU: 2016, 2021

LICZBA STANOWISK: 1

TERMIN MONITORINGU: lipiec - sierpień

OPIS GATUNKU:

Selery węzłobaldachowe to gatunek dość okazałej byliny, o rozgałęzionej gładkiej, dętej łodydze i nieparzystopierzastych liściach. Kwiaty tej rośliny są drobne, białe, osadzone na baldachach wyrastających z węzłów łodygowych. Owocem tego gatunku jest żebrowana, elipsoidalna rozłupnia. W Polsce jest znany tylko na jednym stanowisku gdzie zasiedla nasłonecznione piaszczysto-żwirowe leże. Na stanowisko nie stwierdza się istotnych oddziaływań poza wykaszaniem brzegów cieku wodnego. Selery węzłobaldachowe mogą być także mylone z rosnącym na podobnych siedliskach, markiem szerokolistnym *Sium latifolium*. Marek szerokolistny, ma jednak (tak jak potocznik wodny) liczne pokrywy. W wyjątkowej sytuacji płożące, łąkowe formy selerów węzłobaldachowych (w Polsce takich nie stwierdzono) można pomylić z selerami błotnymi *Apium repens*. Pomyłka w sytuacji kiedy mamy do czynienia z selerami węzłobaldachowymi o wzniesionych łodygach jest praktycznie niemożliwa (selery błotne nie wytwarzają wzniesionych i ulistnionych pędów).



Status prawny i zagrożenie gatunku

Prawo międzynarodowe:

Dyrektywa Siedliskowa - nieuwzględniony

Konwencja Berneńska - nieuwzględniony

Prawo krajowe:

Ochrona gatunkowa - ochrona ścisła od 2004 r.

Kategoria zagrożenia IUCN:

Czerwona Lista IUCN (2014) - LC

Europejska czerwona lista roślin (2011) - LC

Polska Czerwona Księga Roślin (2014) - CR

Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych (2016) - CR

Ocena stanu ochrony

2007: Nie dotyczy

2013: Nie dotyczy

2019: Nie dotyczy

Szybki dostęp

Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2016 (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2020-2021 (PDF, do 10MB)