

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe

Podstawowe informacje

GRUPA: siedliska łąkowe i murawowe


LATA MONITORINGU: 2007-2008, 2014, 2018, 2024

LICZBA STANOWISK: region kontynentalny: 52; region alpejski: 0

TERMIN MONITORINGU: optymalnie maj - czerwiec

OPIS SIEDLISKA:

Siedlisko obejmuje szereg zbiorowisk trawiastych, występujących w piaszczystych miejscach w dolinach dużych rzek, na obszarach morenowych, wydmach śródlądowych, a także w dawnych żwirowniach i wyrobiskach piaskowych, porzuconych piaszczystych polach, nasypach kolejowych. Roślinność ciepłolubnych muraw napiaskowych jest stabilizowana przez wypas. Siedlisko występuje w rozproszeniu w regionie kontynentalnym.



Typowe gatunki roślin

Babka piaskowa *Plantago arenaria*

Chaber nadreński *Centaurea stoebe*

Chondrilla sztywna *Chondrilla juncea*

Gorysz pagórkowy *Peucedanum oreoselinum*

Goździk kartuzek *Dianthus carthusianorum*

Goździk piaskowy *Dianthus arenarius*

Jasieniec piaskowy *Jasione montana*

Jastrzębiec żmijowcowaty *Hieracium echioides*

Kocanki piaskowe *Helichrysum arenarium*

Koniczyna polna *Triforium arvense*

Kostrzewa piaskowa *Festuca psammophila*

Kostrzewa pochwiasta *Festuca vaginata*

Kostrzewa poleska *Festuca polesica*

Kostrzewa szczeciniasta *Festuca trachyphylla*

Lepięźnik kutnerowaty *Petasites spurius*

Lepnica drobnokwiatowa *Silene borysthena*

Lepnica litewska *Silene lithuanica*

Lepnica tatarska *Silene tatarica*

Lepnica wąskopłatkowa *Silene otites*

Lepnica zielonawa *Silene chlorantha*

Lucerna kolczastostrąkowa *Medicago minima*

Łyszczec baldachogronowy *Gypsophila fastigiata*

Macierzanka piaskowa *Thymus serpyllum*

Mietlenik piaskowy *Kochia laniflora*

Naradka północna *Androsace septentrionalis*

Niezapominajka pagórkowa *Myosotis ramosissima*

Piaskownica zwyczajna *Ammophila arenaria*

Pięciornik jedwabisty *Potentilla leucopolitana*

Pięciornik omszony *Potentilla pusilla*

Pięciornik piaskowy *Potentilla arenaria*

Pylenieć pospolity *Berteroa incana*

Rogownica drobnokwiatowa *Cerastium brachypetalum*

Rogownica pięciopręcikowa *Cerastium semidecandrum*

Rojownik pospolity *Jovibarba sobolifera*

Rozchodnik ostry *Sedum acre*

Rozchodnik ościsty *Sedum reflexum*

Rozchodnik sześciorzędowy *Sedum sexangulare*

Smagliczka drobna *Alyssum turkestanicum*

Stokłosa dachowa *Bromus tectorum*

Strzęplica nadobna *Koeleria macrantha*

Strzęplica sina *Koeleria glauca*

Szczotlicha siwa *Corynephorus canescens*

Traganek piaskowy *Astragalus arenarius*

Trzcinnik piaskowy *Calamagrostis epigejos*

Turzyca wczesna *Carex praecox*

Tymotka Boehmera *Phleum phleoides*

Wiosnowka pospolita *Erophila verna*

Wydmuchrzyca piaskowa *Elymus arenarius*

Zawciąg pospolity *Armeria maritima subsp elongata*

Zęboróg purpurowy *Ceratodon purpureus*

Ocena stanu ochrony

Raporty do KE

2007: U2 (CON)

2013: U2 (CON)

2019: U2 (CON)

Szybki dostęp

Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2006-2008 (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2014 (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2015-2018 (PDF, do 10MB)