

2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika

Podstawowe informacje

GRUPA: siedliska morskie i nadmorskie

LATA MONITORINGU: 2010, 2016, 2021

LICZBA STANOWISK: region kontynentalny: 6; region alpejski: 0

TERMIN MONITORINGU: optymalnie czerwiec – sierpień

OPIS SIEDLISKA:

Siedlisko obejmuje kępy zarośli rokitnika zwyczajnego na wydmach, głównie szarych, i w obniżeniach międzywydmowych, w strefie bezpośredniego oddziaływania silnych wiatrów. W skład warstwy krzewów wchodzi też zwykle wierzby: ostrolistna *Salix acutifolia* i wawrzynkowa *S. daphnoides*. Towarzyszy im warstwa zielna zbudowana z gatunków psammofilnych. Siedlisko jest rzadko spotykane, występuje w rozproszeniu, a znaczna część zarośli rokitnika pochodzi z nasadzeń w celu stabilizacji wydm.



Typowe gatunki roślin

Bodziszek cuchnący *Geranium robertianum*

Groszek nadmorski *Lathyrus japonicus*

Jasieniec piaskowy *Jasione montana*

Kostrzewa czerwona *Festuca rubra*

Pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*

Rokitnik zwyczajny *Hippophaë rhamnoides*

Trzcina pospolita *Phragmites australis*

Ocena stanu ochrony

Raporty do KE

2007: XX (CON)

2013: U1 (CON)

2019: U1 (CON)

Szybki dostęp

Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2010 (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2016 (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2021 (PDF, do 10MB)