



# 1026 Ślimak winniczek

## *Helix pomatia*

### **i** Podstawowe informacje

**Grupa:** bezkręgowce, mięczaki, ślimaki

**Lata monitoringu:** 2009-2011, 2013-2014, 2023-2024

**Liczba stanowisk:** 182

**Termin monitoringu:** druga dekada kwietnia-czerwiec

**Opis gatunku:**

Winniczek to gatunek płucodyszny ślimaka lądowego z rodziny ślimakowatych. Wysokość muszli tego gatunku waha się od 40 do 55 mm, przy średnicy do 50 mm. Muszla ma kształt stożkowato-kulisty i zazwyczaj jest prawoskrętna. Kolor muszli jaśnieje wraz z wiekiem w wyniku ścierania się warstwy konchiolinowej. Na muszli widoczne są spiralnie skręcone smugi o nieco ciemniejszej barwie, które powstają wraz z jej przyrostem. Wargę muszli wraz z wiekiem twardnieje, pogrubia się i uzyskuje wyraźny kształt, wywijając się na zewnątrz. Ciało jest koloru żółtoszarego. Ślimak winniczek w Polsce występuje na terenie całego kraju. Preferuje siedliska o dużej wilgotności i zacienieniu, tj. obrzeża lasów liściastych i mieszanych, nadwodne zarośla, olszyny, łąki i murawy w pobliżu cieków wodnych. Występuje również w środowiskach synantropijnych, takich jak parki, ogrody, rumowiska, przydroża czy cmentarze.

### **➔** Status prawny i zagrożenie gatunku

#### **Prawo międzynarodowe:**

Dyrektywa Siedliskowa – załącznik V  
Konwencja Berneńska – załącznik III

#### **Prawo krajowe:**

Ochrona gatunkowa – ochrona częściowa

#### **Kategoria zagrożenia IUCN:**

Czerwona lista IUCN – LC

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (2004) – nieuwzględniony

### **M** Lokalizacja stanowisk



### **📄** Ocena stanu ochrony

#### Raporty do KE

- **2007:** FV (ALP), FV (CON)
- **2013:** FV (ALP), FV (CON)
- **2019:** FV (ALP), FV (CON)

### **📄** Szybki dostęp

- Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)
- Wyniki monitoringu 2013-2014 (PDF, do 10MB)
- Wyniki monitoringu 2024 (PDF, do 10MB)