



# 1106 Łosoś atlantycki

## *Salmo salar*

### **i** Podstawowe informacje

**Grupa:** kręgowce, ryby

**Lata monitoringu:** 2009-2010 i 2015-2016

**Liczba stanowisk:** 14

**Termin monitoringu:** sierpień–październik

**Opis gatunku:**

Łosoś atlantycki to gatunek dwurodowiskowej ryby z rodziny łososiowatych, o wrzecionowatym kształcie ciała. Osiąga nawet do 1,5 m długości i 36 kg masy. Głowa jest duża, a paszcza mocno uzębiona. Narybek łososia atlantyckiego charakteryzuje się dużymi oczami, plamami na wieczku skrzelowym w liczbie od 1 do 3, szarym kolorem płetw, wąskim trzonem ogona i dużą, jasną płetwą odbytową. U osobników młodocianych widoczne są plamy narybkowe na boku ciała. Gdy tylko stanie się zdolny do splywania do morza, zatracą plamiste ubarwienie ochronne na rzecz stalowo-szaro-srebrnego. Odbywa wędrówki tarłowe do wód słodkich, do rzek i potoków ze żwirowym dnem i dobrze natlenioną wodą. Podczas wędrówki ubarwienie zmienia się na oliwkowo-szare lub ciemnobrązowe. W Polsce obecne populacje łososia atlantyckiego to efekt restytucji, zarybiania importowanym materiałem, w wyniku którego utworzyły się niewielkie populacje w rzekach pomorskich.

### **➔** Status prawny i zagrożenie gatunku

#### **Prawo międzynarodowe:**

Dyrektywa Siedliskowa – załącznik II i V

Konwencja Berneńska – załącznik III

Konwencja Helsińska

#### **Prawo krajowe:**

Ochrona gatunkowa – nie dotyczy


#### **Kategoria zagrożenia IUCN:**

Europejska czerwona lista IUCN – VU

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001) – CR

Czerwona lista minogów i ryb (2009) – EW/CD

### **M** Lokalizacja stanowisk



### **☰** Ocena stanu ochrony

#### Raporty do KE

- **2007:** U1 (CON)
- **2013:** U2 (ALP), U2 (CON)
- **2019:** U2 (CON)

### **📄** Szybki dostęp

- [Metodyka monitoringu \(PDF, do 10MB\)](#)
- [Wyniki monitoringu 2009-2010 \(PDF, do 10MB\)](#)
- [Wyniki monitoringu 2015-2016 \(PDF, do 10MB\)](#)